

Вирус - хепатитис Б – информација

Код вируса хепатитиса Б ради се о инфективној болести познатој већ годинама чији је узрочник вирус хепатитиса Б. Акутни хепатитис Б спада у оболења која се морају пријавити. Он доводи до упале јетре. Могу наступити следећи симптоми болести:

некарактеристични болови у горњем делу трбуха, губитак апетита, мучнина, повраћање, умор и жутица.

Док се инфекција вирусом хепатитиса А лечи без последица, након акутне инфекције хепатитисом Б може доћи до задржавања вируса у организму и до хроничне упале јетре. Претпоставља се да се то догађа у 5-10% случајева. Оболели су угрожени повећаним разарањем станица јетре, развојем тзв. цирозе јетре или настајањем рака јетре (хепатоцелуларни карцином).

Преношење вируса хепатитиса Б одвија се преко крви и телесним текућинама у којима је садржан вирус. Он је могућ на различите врсте:

- Раније је хепатитис Б био проматран често након трансфузије крви. Овај начин преношења инфекције захвалјујући брижљивим рутинским и извршеним контролама не игра више неку улогу.
- Чести начин преноса данас је сексуални контакт, пре свега незаштићен сексуални контакт без кондома са сексуалним партнерима чији претходни сексуални живот није познат, затим лица који су овисници о дрогама или која често мењају своје partnере.
- Међу овисницима о дрогама који користе заједничке инфициране игле често долази до ширења вируса хепатитиса Б.
- Осим тога угрожена су и лица која професионално често долазе у контакт с крвљу и производима од крви, као што су медицинска лица, будући да се вирус може пренети и директним контактом крви с крвљу.
- Тетовирање, акупунктура и бушење ушију могу доћи у обзир као далјњи начини преноса.
- Могућ је и пренос хепатитиса Б с хронично инфициране мајке на дете приликом порога.

Заштита од инфекције хепатитисом Б је могућа. У првом реду мора се навести целпјење против хепатитиса Б које се у међувремену проводи код многе деце и које се препоручује за ризичне групе. Као и код ХИВ инфекције кондоми могу смањити ризик од заразе вирусом хепатитиса Б. Овисници о дрогама не смеју никада користити игле које су употребили други овисници. При раду с крвљу и производима од крви медицинска лица се морају придржавати уобичајених хигијенских прописа.

Сви хронични носиоци хепатитиса Б би требали обратити пажњу на следећа правила понашања:

- Сваки сексуални партнер се мора информисати о инфекцији хепатитисом Б. Морали би се користити кондоми. Сексуални партнери који нису инфицирани би требали да оду на преглед и цеpljeње.
- Лекари који проводе лечење, стоматолози, лица која имају дозволу органа власти за провођење лечења и лица која обављају професионалне или почасне делатности у хитној помоћи морају се такође информисати о инфекцији хепатитисом Б, уколико се чини да је могућ пренос вируса.
- Не сме се даровати крв. То вреди на сличан начин и за даривање сперме, ткива или органа.
- Игле се након интравенозне инјекције не смеју давати на даљњу употребу другим лицима (овисници о дрогама).

Мора се упозорити на чињеницу да се намерно преношење заразе на друго лице вирусом хепатитиса Б према Казненом закону може третирати и казнити као нашоње телесне повреде.

Уколико бисте имали даљњих питања или, пак, желите бесплатни савет, можете нас добити на број: